Ficha Técnica
IODOPOVIDONA DÉRMICA 10% (I-1%) SOLUÇÃO DÉRMICA

1. Tipo de Produto

Biocida
Grupo 1, tipo de produto 1

2. Marca Comercial

AGADINE IODOPOVIDONA-SOLUÇÃO DÉRMICA A 10% (I-1%)

500 mL/ 125 mL/80 mL/10 mL

3. Substâncias Activas e Respectivos Nºs CAS

Substâncias Activas	**Quantitativos**	Nºs CAS
$(C_6H_9NO)_n$ x l – Iodopovidona: Polivinilpirrolidona com iodo	10 g	25655-41-8
Excipientes	**Quantitativos**	**Nºs CAS**
$C_3H_8O_3$ - Glicerol	1 g	56-81-5
$PO_4Na_2H.2H_2O$Fosfato Dissódico Dihidratado	1,05 g	7558-79-4
C6H8O7H2O-Ácido Cítrico Monohidratado	0,39g	5949-29-1
C5H10O2 2-methyloxirane; oxirane	0,25g	9003-11-6
IK - Iodeto de Potássio	0,03 g	7681-11-0
H_2O purificada	100 mL	7732-18-5

4. Fabricante

Fabricante	AGA – Álcool e Géneros Alimentares, S.A.	
Endereço	Rua Professor Henrique de Barros N.º 8-8 A	2685-338 . Prior velho
Número de Telefone	21940 92 00 - 21940 92 40	
Número de FAX	21940 92 60 - 21940 92 61	
E-mail	info@aga.pt	
Página de Internet	http://www.aga.pt	
Número de Telefone de Urgência (CIAV)	800 250 250	

5. Fórmula Farmacêutica

Solução

6. Características Físicas

- Líquido
- Castanho
- Límpido
- Cheiro característico a iodo



Atenção

Provoca irritação ocular grave.
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

7. Especificação

DETERMINAÇÕES	MÉTODO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	x	Líquido
Cor	Visual	x	Acastanhada
Odor	Olfactivo	x	Caract. a iodo
pH	F.P.	x	3,5-5,5
Doseamento (iodo activo)	F.P.	g% m/v	0,85 a 1,2

8. Modo de Utilização

Indicações e Modo de usar:

- Desinfecção da pele antes de qualquer intervenção.
- Aplicar localmente cerca de 3mL a solução mantendo o contacto durante 5 minutos. Deixar secar ao ar.

Precauções:

- Não ingerir.
- Uso externo
- Evitar o contacto com os olhos…
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal for possível. Continuar a enxaguar.
- Se produzir irritação cutânea ou alergia, suspender a aplicação.
- Manter fora do alcance das crianças.
- EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um centro de informação anti-venenos ou um médico (telefone: 808 250 143).

Contra-indicações:

- Não utilizar em indivíduos com sensibilidade ao iodo, durante a gravidez, nem em crianças até 2 anos.

9. Organismos Alvo

Actividade Bactericida Eficaz
Estirpes de referência:
Escherichia coli ATCC 10536
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Enterococcus hirae CIP 5855
Mycobacterium smegmatis ATCC 16404

Actividade Fungicida Eficaz
Estirpes de Referência
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus niger ATCC 16404

10. Locais de Aplicação

Na pele sã como anti-séptico-bactericida e fungicida.

11. Incompatibilidades

Incompatibilidades-Não utilizar ao mesmo tempo que sabões ou produtos derivados do mercúrio.

12. Conservação

Em recipiente bem fechado, ao abrigo da luz solar indirecta, em lugar fresco e seco.
Válido por três anos.
Lote e validade: ver embalagem.

13. Informação Bibliográfica

Identificação e doseamento conforme F.P.
D.L. 121/2002 de 3 de Maio
UNE-EN 1276
UNE-EN 1275